SANITIZING OF FOOD PROCESSING EQUIPMENT AND OTHER HARD SURFACES IN FOOD CONTACT LOCATIONS: For sanitizing food processing equipment, dairy equipment, food utensils, dishes, silverware, glasses, sink tops, counter tops, refrigerated storage and display equipment and other hard nonporous surfaces. No potable rinse is required. Wash and rinse all articles thoroughly, then apply a solution of 2 mL **UNITED C64** in 1 litre of water (150 ppm active). Surfaces should remain wet for at least 1 minute followed by adequate draining and air drying. Fresh solution should be prepared daily or when use solution becomes visibly dirty. For mechanical application, use solution may not be reused for sanitizing applications. Apply to sink tops, counter tops, refrigerated storage and display equipment and other stationary hard surfaces by cloth, brush, or mechanical spray device. No potable water rinse is required. Dishes, silverware, glasses, cooking utensils and other similar size food processing equipment can be sanitized by immersion in a 2 mL/L solution of **UNITED C64**. No potable rinse required.

PRECAUTIONARY STATEMENTS: KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.
Danger: Corrosive to eyes. Do not get in eyes, on skin or on clothing. Harmful if swallowed. Avoid contamination of food.

FIRST-AID: In case of contact, immediately flush eyes or skin with plenty of water for at least 15 minutes. For eyes, call a physician. Remove and wash contaminated clothing before reuse. If swallowed, drink promptly a large quantity of milk, egg white gelatin solution, or if these are not available, drink large quantities of water. Avoid alcohol. Call a physician immediately.

TOXICOLOGICAL INFORMATION: Probable mucosal damage may contraindicate the use of gastric lavage. Measures against circulatory shock, respiratory depression and convulsion may be needed.

NOTICE TO USER: This control product to be used only in accordance with the directions on this label. It is an offense under the Pest Controls Products Act to use a control product under unsafe conditions.

DISPOSAL:
1. Rinse the empty container thoroughly and add the rinsings to treatment site.
2. Follow provincial instructions or any required additional cleaning of the container prior to its disposal or reconditioning.
3. Dispose of the container in accordance with provincial requirements.
4. For information on the disposal of unused, unwanted product and the cleanup of spills contact the regional office of Environment Canada.
5. For small spills. Recover free liquid. Soak up residue with solids absorbent. DO NOT FLUSH INTO SURFACE STREAMS. INFORM ENVIRONMENT CANADA AS IN NO. 4.

DIRECTIONS FOR USE: Apply **UNITED C64** with a cloth or mop. Treated surfaces must remain wet for 10 minutes. Fresh solution should be prepared daily or when the used solution becomes very dirty.

DISINFECTION IN HOSPITALS, NURSING HOMES AND OTHER HEALTH CARE INSTITUTIONS: For disinfecting floors, walls, counter tops, bathing areas, lavatories, bedframes, tables, chairs, garbage pails and other hard nonporous surfaces. Add 6 mL **UNITED C64** to 1 litre water. Apply to previously cleaned hard surfaces. At this use level, **UNITED C64** is effective against Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus and Salmonella choleraesuis in the presence of 5% blood serum, when evaluated by the AOAC Use-Dilution Test.

DISINFECTION OF INSTITUTIONS, INDUSTRY AND SCHOOLS: Add 6.0 mL of **UNITED C64** to 1 litre of water. At 1.75 mL/litre of water use level, the fungicidal effectiveness of **UNITED C64** in the presence of 5% blood serum against Trichophyton mentagrophytes has been shown, utilizing the AOAC Fungicidal Test.

DISINFECTION OF BARBER TOOLS: Precleaned barber tools (such as combs, brushes, razors and scissors), can be disinfected by immersing in a 2 mL/L solution of **UNITED C64**.

DISINFECTION OF POULTRY EQUIPMENT, ANIMAL QUARTERS AND KENNELS: Poultry brooders, watering fountains, feeding equipment and other animal quarters (such as stalls and kennel areas) can be disinfected after thoroughly cleaning by applying a solution of 6 mL **UNITED C64** to 1 litre of water. Small utensils should be immersed in this solution. Prior to disinfection, all poultry, other animals and their foods must be removed from the premises. This includes emptying all troughs, racks and other feeding and water appliances. Remove all litter and droppings from floors, walls and other surfaces occupied or traversed by poultry or other animals. After disinfection, ventilate buildings, coops and other closed spaces. Do not house poultry, or other animals or employ equipment until treatment has been absorbed, set or dried. All treated equipment that will contact food or drinking water must be rinsed with potable water before reuse.

Printed in U.S.A. 303

NET CONTENTS:

UNITED
LABORATORIES

DISINFECTANT
CLEANER SANITIZER
FUNGICIDE DEODORIZER

WITH ORGANIC SOIL TOLERANCE FOR HOSPITALS, INSTITUTIONAL, INDUSTRIAL, SCHOOL, DAIRY AND OTHER FARM USE

UNITED C64

NETTOYANT • DESINFECTANT ASSAINISSANT FONGICIDE DÉSODORISANT

AVEC TOLÉRANCE AUX DÉPÔTS ORGANIQUES POUR UTILIZATION DANS LES HÔPITAUX, INSTITUTIONS ET ÉTABLISSEMENTS INDUSTRIELS ÉCOLES, LAITERIES ET FERMES

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.
GARDER HORS DE LA PORTÉÉ DES ENFANTS
FOR INDUSTRIAL, INSTITUTIONAL & FOOD PLANT USE
POUR USAGE INDUSTRIAL, INSTITUTIONNEL ET USINE ALIMENTAIRE

GUARANTEE/GARANTIE:

n-Alkyl (40%C12, 50%C14, 10%C16) dimethylbenzyl ammonium chloride	**3.000%**
Octyl decyl dimethyl ammonium chloride	**2.250%**
Dioctyl dimethyl ammonium chloride	**0.900%**
Didecyl dimethyl ammonium chloride	**1.350%**

AVOID CONTAMINATION OF FOOD
EVITER LA CONTAMINATION DES ALIMENTS

REGISTRATION NO. 25057
PEST CONTROL PRODUCTS ACT
DIN NO. 02237617

NO. D'ENREGISTREMENT 25057 LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES
NO. DIN 02237617

WARNING • AVERTISSEMENT

CAUTION
CORROSIVE

ATTENTION
CORROSIF

READ THE LABEL BEFORE USING • LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI

NET CONTENTS **20 Litres** ☐

CONTENU NET **210 Litres** ☐

Call Toll Free: 1-800-323-2594

Sold By:

UNITED LABORATORIES OF CANADA, INC.
Downsview, Ontario M3J 2N2

ASSAINISSEMENT DE L'ÉQUIPMENT DE TRAITEMENT DES ALIMENTS ET AUTRES SURFACES DURES DESTINÉES À UN CONTACT AVEC DES ALIMENTS: Pour assainir l'équipement de traitement des aliments, équipement laiter, ustensiles de cuisine, vaisselle, verres, dessus d'éviers, comptoirs, réfrigérateurs, étalages et autres surfaces non poreuses. Un rincage a l'eau potable n'est pas nécesaire. Bien laver et rincer tous les articles, puis appliquer un solution de 2 mL de **UNITED C64** par litre d'eau (150 ppm d'ingrédients actifs). Laisser la surface mouilée au moins pendant 1 minute, puis égoutter le plus possible de solution et laisser sécher. Préparer une solution fraîche tous les jours ou changer la solution dès qu'elle est sale. Pour un application mécanique, la solution de travail ne peut pas être réutilisée pour l'assainissement. Pour les dessus des éviers, des comptoirs, compartiments et étalages réfrigérés ou autres surfaces dures non mobiles, appliquer au moyen d'un chiffon, d'une brosse ou d'un vaporisateur mécanique. Un rincage à l'eau potable n'est pas nécessaire. Pour assainir la vaisselle, les verres, les ustensils de cuisine et autre equipement alimentaire similaire, immerger dans une solution de 2 mL de **UNITED C64** par litre. Un rincage à l'eau potable n'est pas nécessaire.

PRECAUTIONS: GARDER HORS DE LA PORTEE DES ENFANTS.
Danger: Corrosif pour les yeux. Ne pas éclabousser dans les yeux, sur la peau ou les vêtements. Nocif en cas d'ingestion. Éviter de contaminer les aliments.

PREMIERS SOINS: En cas de contact avec la peau ou les yeux, rincer immédiatement à grande eau pendant au moins 15 minutes. Pour le contact avec les yeux, consulter un médecin. Retirer et laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser. En cas d'ingestion, boire immédiatement, si disponible, beaucoup de lait, des blancs d'oeufs ou une solution gélatineuse; sinon, boire beaucoup d'eau. Éviter l'alcohol. Consulter immédiatement un médicin.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES: Des lésions probables des muqueses peuvent contre-indiquer un lavage d'estomac. Il pourrait etre necessaire de prendre des mesures contre un choc circulatoire, un dépression respiratoire ou des convulsions.

À L'ATTENTION DE L'USAGER: Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. L'emploi d'un tel produit dans des conditions dangereuses constitue une infraction à la Loi sur les produits antiparasitaires.

ELIMINATION:
1. Rincer à fond le contenant vide et verser le liquide de rincage au site de traitement.
2. Suivre les règlements provinciaux en cas de nettoyage supplémentaire du contenant, avant son élimination ou recyclage.
3. Éliminer le contenant conformément aux réglements provinciaux.
4. Pour tout renseignement concernant l'elimination du produit non utilisé ou le nettoyage en COS de déversement accidentel consulter le Bureau regional d'Environnement Canada.
5. En cas de déversements peu important récupérer le liquide. Absorber les résidues au moyer d'une substance absorbante. NE JAMAIS DEVERSER DANS LES COURS D'EAU. INFORMER ENVIRONNEMENT CANADA COMME INDIQUE AU PARAGRAPHE 4.

MODE D'EMPLOI: Appliquer la solution de **UNITED C64** avec un linge ou une vadrouille. Les surfaces traitées doivent rester mouillées pendant 10 minutes. Préparer une solution fraîche chaque jour ou changer la solution lorsqu'elle est visiblement sale.

DÉSINFECTION DES HOPITAUX, MAISONS DE SOINS INFIRMIERS ET AUTRES ÉTABLISSEMENTS DE SOINS: Pour désinfecteur les planchers, murs, comptoirs, salles de bains, lavabos, cadres de lits, tables, chaises, poubelles et autres surfaces dures non poreuses. Verser 6 mL de **UNITED C64** par litre d'eau. Appliquer sur des surfaces dures propres. À cette concentration, **UNITED C64** est efficace contre les Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus et Salmonella choleraesuis en présence de 5% de sérum sanguin, lorsqu'évaluè par leAOAC Use-Dilution Test.

DÉSINFECTION DES INSTITUTIONS, ÉTABLISSEMENTS INDUSTRIELS ET ÉCOLES: Verser 6 mL de **UNITED C64** par litre d'eau. À une concentration de 1.75 mL litre d'eau, **UNITED C64** a démontré son efficacité fongicide contre les Trycophyton mentagroghytes, en présence de 5% de sérum sanguin, lorsqu'évalué par leAOAC Fungicidal Test.

DÉSINFECTION DES OUTILS DE BARBIER: Les outils de barbier pré-nettoyé (peignes, brosses, rasoirs et ciseaux peuvent être désinfectés par immersion dans une solution de 2 mL de **UNITED C64** par litre d'eau.

DÉSINFECTION DE L'ÉQUIPEMENT DES POULAILLERS, PARCS D'ANIMAUX ET CHENILS: Les couveuses, abreuvoirs, mangeoirs et autres installations pour animaux (tels que étables et chenils), peuvent être désinfectés aprés un bon nettoyage au moyen d'une solution de 6 mL de **UNITED C64** par litre d'eau. Les petits ustensiles peuvent être trempés dans cette solution. Avant la désinféction, faire sortir tous les animaux des installations et sortir aussi leur nourriture. Il faut également vider les abreuvoirs, les étagéres et autres appareils d'alimentation et distribution de l'eau. Enlever la litiére et les dépôts sur les planchers, les murs et sur toutes surfaces occupées ou, traversées par la volaille ou les autres animaux. Aprés la désinfection, aérer les bâtiments, abris et autres espaces clos. Attendre que la solution soit absorbée, ait agit ou soit séche avant de faire entrer la volaille ou autres animaux, et avant d'utiliser l'equipment. Rincer soigneusement à l'eau potable toutes les surfaces destinées à un contact avec des aliments tels que les mangeoires ou abreuvoirs avant emploi.